

SNOEI INSTRUCTIE HEGGEN

Op ons complex staan 3 soorten heggen aangeplant, namelijk:

1. **Cotoneaster** (Dwergmispel)
2. **Carpinus betulus** (Haagbeuk)
3. **Spirea arguta** (Spierstruik)

Dit document geeft informatie over hoe deze het beste kunnen worden gesnoeid.

Een goede snoei zorgt voor een compacte groei.

In het algemeen geldt voor alle drie de soorten heggen het volgende:

- a. Niet snoeien als het hard vriest
- b. Niet snoeien bij volle zon of als het erg heet is
- c. Als je veel van de haag moet snoeien om deze op breedte en hoogte te krijgen doe dit niet in een keer maar in etappes. Vraag advies of hulp als je niet precies weet hoe dit te doen.

1. Cotoneaster franchetii (Dwergmispel)



Cotoneaster is een winterharde groenblijvende heester. De kleine blaadjes zijn glanzend groen met een viltig grijze onderkant. Bij zeer strenge vorst is de heester half groenblijvend en verliest hij een deel van het blad. De bloei vindt plaats in juni en juli met roze rode bloemen. Deze zijn aantrekkelijk voor bijen. Daarna verschijnen de oranje rode bessen, die lang kunnen blijven hangen.

Cotoneaster is vrij gemakkelijk te snoeien en kan redelijk wat hebben. Probeer zo veel mogelijk de haag recht boven de wortel te houden zodat deze niet gaat overhellen. Laat de buitenkant net zoveel uitgroeien als de binnenkant. Het beste om te snoeien is in het voorjaar of na de bloei juni-juli in de zomer.

Een te droge grond gaat ten koste van de bloei en de bessen. Verdere verzorging kan bestaan uit het toedienen van organische mest.

2. *Carpinus betulus* (Haagbeuk)

De haagbeuk lijkt veel op de beukenhaag (*Fagus Sylvatica*), maar deze laatste is bladhoudend, terwijl de haagbeuk (berken familie) bladverliezend is. De nieuwe bladeren van de haagbeuk schieten al relatief vroeg in het jaar door.

Hij wordt mooi en compact wanneer hij 2x per jaar gesnoeid wordt. De eerste snoei vindt bij voorkeur vóór 21 juni plaats. Zo heeft hij ruim de tijd om uit te lopen en zal hij in het voorjaar en in de zomer mooi in bloei staan. Ook heeft de haagbeuk zo nog voldoende tijd om te herstellen voordat de volle zon erop gaat schijnen.

De tweede snoeibeurt plan je in het najaar, liefst eind september. Zo kan de haagbeuk zich nog even voorbereiden op de (nacht)vorst. Deze tweede snoeibeurt is overigens optioneel en aan te raden als je van een strakke en formele haag houdt. Voor zowel de eerste als de tweede snoei is aangeraden dit op een bewolkte dag te doen. Hiermee voorkom je dat de jonge blaadjes verbranden door het zonlicht en daardoor slechter (of zelfs niet) herstelt.



3. *Spiraea arguta* (Spierstruik)



Het kleine blad van de Spiraea is langwerpige en smal en is eerst lichtgroen en wordt later donkerder groen van kleur. De heester is bladverliezend. De overhangende takken vertonen in april en mei een uitbundige en rijke bloei met witte bloemen. Vanwege het spierwitte van de grote hoeveelheid bloemen, wordt de struik ook wel Sneeuwspiraea genoemd.

Snoei direct ná de bloei terug, uiterlijk vóór 1 juli. Mocht de haag veel te groot zijn en er veel verwijderd moet worden kan dit ook in de wintermaanden (maar nooit bij vorst).

Bij **verjongings snoei** snoei je 1/3 van de oudste takken terug tot vlak boven de grond. Er groeien nieuwe twijgen terug, waardoor een mooie volle en goed bloeiende heester ontstaat. Organische mest in het voorjaar bevordert een overvloedige bloei.